

**Klinické hodnocení veterinárního léčivého přípravku Gabon Flum 4 mg  
proužky do úlu**

**FORMULÁŘ pro rok hodnocení 2015  
pro záznamy sledovaných parametrů**

**Objednavatel (OV ČSV, ZO ČSV, chovatel):**

Název , jméno: .....

Kontaktní údaje (adresa, tel,e-mail):.....

.....

**Počet ošetřených včelstev:**.....

**Datum vložení Gabonu Flum 4 mg proužky do úlu do včelstev:**

.....

**Byl prováděn pravidelný monitoring přirozeného denního spadu roztočů v období před  
vložením Gabonu Flum ?**  ano  ne

Při odpovědi **ano** uveďte nejvyšší zjištěné hodnoty: Denní spad .....

Oklepem .....včel .....

**Pozorovali jste po vložení Gabonu Flum větší rozrušení včel nebo jiné nepříznivé  
příznaky, např. větší agresivitu, souboje včel, opouštění úlu pod.?**  ano  ne

Při odpovědi **ano** uveďte u kolika včelstev a popište podrobněji pozorované příznaky.

.....

.....

**Pozorovali jste v průběhu nasazení Gabonu Flum větší neklid na včelnici, větší slídění  
nebo dokonce loupež?**  ano  ne

Při odpovědi **ano** popište jednotlivé případy podrobně.....

.....

**Pozorovali jste při manipulaci s Gabonem Flum u sebe i při použití ochranných  
prostředků některé příznaky alergické reakce?**  ano  ne

Při odpovědi **ano** popište své potíže podrobně.....

.....

**Zjistili jste včelstva, ve kterých byl spad roztočů v prvních dvou dnech po vložení  
Gabonu Flum nižší nebo stejný než přirozený denní spad před vložением Gabonu Flum?**

ano  ne

Při odpovědi **ano** uveďte u kolika včelstev .....

**Považujete spad roztočů v průběhu celé léčby za:**

- přiměřený aktuální nálezové situaci**
- nedostatečný**

Při odpovědi **nedostatečný** rozveďte podrobně důvody, které vedly k tomuto závěru.

.....

**Datum odstranění Gabonu Flum ze včelstev:**.....

**Použité proužky byly vráceny (komu) .....**

**Datum nejbližší následné fumigace Varidolem 125 mg/ml (říjen) po odstranění Gabonu Flum 4 mg ze včelstev:**

.....

**Spad roztočů po následné fumigaci Varidolem hodnotím následovně:**

- u všech včelstev byl spad v desítkách**
- u většiny včelstev byl spad v desítkách, u některých do 300**
- u většiny včelstev byl spad do 200, u některých 300 - 500**
- nepřiměřeně vysoký, u většiny včelstev nad 300 - 500**

Při odpovědi **nepřiměřeně vysoký** uveďte skutečnou průměrnou hodnotu zjištěného spadu roztočů po fumigaci a podrobné zdůvodnění nepřiměřenosti spadu po fumigaci.

.....

.....

**Datum**.....

**Podpis**.....,

#### *Poznámka*

*Zvolenou odpověď označte křížkem ve čtverečku, který je umístěn před odpovědí nebo zakroužkujte správnou. Pokud pro vlastní vysvětlení nebude ve formuláři dostatek místa, pokračujte na samostatném listu nebo na zadní straně formuláře. Uvítáme i další vlastní poznatky a postřehy, které uveďte stejnou formou.*